

Table 2. Quantitative data on number, weight or size of lymphoid organs in normal young adult man

Authors	Leiber (1961)	Hellman (1921/1926)	Krumb- haar (1939)	Cornes (1965)	Hammar (1936)
Lymph nodes	460/man				
Spleen (total)		136 g	154 g		
White pulp		18 g			
Peyer's patches (Total area)		150/man		200/man	
Thymus		90 cm ²			26 g

Cornes, J. S.: Number, size, and distribution of Peyer's patches in the human small intestine. I. The development of Peyer's patches. II. The effect of age on Peyer's patches. *Gut* 6, 225-233 (1965)

Hammar, J. A.: Die normal-morphologische Thymusforschung im letzten Vierteljahrhundert. Analyse und Synthese. Leipzig: Barth 1936

Hellman, T. J.: Studien über das lymphoide Gewebe. IV. Zur Frage des Status lymphaticus. Untersuchungen über die Menge des lymphoiden Gewebes, besonders des Darmes beim Menschen mittels einer quantitativen Bestimmungsmethode. *Z. Konstit.-Lehre* 8, 191-219 (1921)

Hellman, T.: Die Altersanatomie der menschlichen Milz. Studien besonders über die Ausbildung des lymphoiden Gewebes und der Sekundärknötchen in verschiedenen Altern. *Z. Konstit.-Lehre* 12, 270-415 (1926)

Krumbhaar, E. B., Lippincott, S. W.: Postmortem weight of "normal" human spleens at different ages. *Amer. J. med. Sci.* 197, 344-358 (1939)

Leiber, B.: Der menschliche Lymphknoten. München-Berlin: Urban & Schwarzenberg 1961